


肺炎球菌ワクチン予防接種の費用を助成します。

吉備中央町では、肺炎球菌ワクチン予防接種の費用を一部助成いたします。希望される方は、役場保健課、加茂川総合事務所、各支所へ申請を行い、『肺炎球菌予防接種券』を持って、町内の指定医療機関で接種されますようお願いいたします。

(注：接種後の申請はできません)

1. 接種費用 接種料から助成額 3,000 円を差し引いた額を接種した医療機関へお支払いください。
(接種料は、医療機関によって異なります。)(生活保護世帯は無料)
2. 助成対象者 町内に住所がある方で、下記のいずれかに当てはまる方
 - ① 接種日において65歳以上の方
 - ② 人工透析もしくは呼吸機能障害による身体障害者手帳保持者、在宅酸素療法患者で医師が必要と判断した方
3. 接種期間 随時受付

4. 接種の流れ



肺炎球菌予防接種実施医療機関へ事前の予約が必要です。

- ◎接種後の申請は出来ませんので、必ず接種前に申請ください。
- ◎接種後、医療機関から予防接種済証が交付されます。接種したことの証明になりますので、紛失しないように大切に保管してください。

肺炎球菌ワクチン予防接種 Q&A

※肺炎球菌ワクチン予防接種とは※

高齢者の肺炎の原因の中で、最も頻度の高い「肺炎球菌」という細菌感染を予防するワクチンです。肺炎球菌には80種類以上の型がありますが、肺炎球菌ワクチン接種によりそのうちの23種類に対して免疫をつけることができます。接種により肺炎球菌の8割に効果があるとされています。「肺炎球菌ワクチンはすべての肺炎に有効ということではない」ことをご理解ください。

※ 肺炎球菌ワクチンの効果

ワクチン接種後、免疫ができるまでに平均3週間ほどかかります。また、1回の接種で免疫効果は5年以上に渡って持続するといわれています。

肺炎球菌に対する免疫ができると、肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。

※ 肺炎球菌ワクチンとインフルエンザ予防接種について

インフルエンザによって肺炎になることも少なくありません。両方の予防接種を受けることで、より肺炎の予防効果があるといわれています。

肺炎球菌ワクチンの接種を受けた後でも、インフルエンザ予防接種を受けることができます。ただし、接種間隔は6日以上あけて接種してください。また、インフルエンザ予防接種を受けた後でも、肺炎球菌ワクチンを受けることができます。ただし、接種間隔は6日以上あけて接種してください。

このワクチンは個人予防目的のために行うものです。対象者の方は、自らの意思と責任で接種を希望する場合に行うようにしましょう。予防接種は体調の良いときに受けることが原則です。また、安全に予防接種が受けられるように、かかりつけの医師と相談のうえ予防接種の効果や副反応について十分理解していただき、予防接種を受けることをお勧めします。

肺炎球菌ワクチンの接種について ～よく読んで受けましょう～

【予診票記入するとき】

肺炎球菌の予防接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、予診票にできるだけ詳しくご記入ください。

ご高齢の方などで、ご自身でのご記入が難しい方が接種を希望されている場合には、健康状態をよく把握しているご家族の方など代理人がご記入ください。

【予防接種を受けることができない方】

次のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を行うことができません。

- ① 明らかに発熱がある人
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
(急性の病気で薬を飲む必要のあるような人は、その後の病気の変化が分からなくなる可能性もあるので、その日は見合わせるのが原則です。)
- ③ 今まで受けた予防接種によってアナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな人
(『アナフィラキシー』というのは通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんがでる、吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身反応です。)
- ④ その他、医師が不適當な状態と判断した場合

【予防接種を受けるに際し、担当医師とよく相談しなくてはならない人】

- ① 心臓病、腎臓(じんぞう)病、肝臓病や血液、その他慢性の病気で治療を受けている人。
- ② 予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発疹(ほっしん)、じんましんなどアレルギーを思わす異常が見られた人。
- ③ 今までにけいれんを起こしたことがある人。
- ④ 過去に免疫不全の診断がなされたことのある方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方。
- ⑤ アレルギーを起こすおそれのある方。

【接種後の注意】

- ① 接種当日は激しい運動は避けてください。（接種当日の入浴は差し支えありません。ただし注射したところをこすらないでください。）
- ② 接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般にその症状は軽く、通常、数日中に消失します。
- ③ 接種後は自らの健康管理に注意し、もし、高熱や体調の変化、その他局所の異常反応に気づいたらただちに医師の診察を受けてください。

お問い合わせは

吉備中央町 保健課 ☎ (0866) 54-1326